



INDIKINA Infantil®

- Composició** Cada comprimit conté: diversió, imaginació, jocs, excursions, tallers, aventures, pionerisme, campaments, servei i bon humor.
- Acció** L'Indikina és eficaç contra l'avorriment, l'ensopiment i la depressió. Especialment indikat per aquells que no poden desenganxar-se de la tele.
- Indikacions** Alleugeriment dels símptomes post-vacances, apalancament i principis de col·legitis aguda. Estats de mandritis i dolors de cul de tant sofà.
- Posologia** Dosis mitjanes recomanades:
Nens i nenes de 8 a 11 anys: mig comprimit per cada aplicació, fins a un màxim de 6 al mes; especialment dissabtes a la tarda de 4,30 a 7 i un màxim de cap de setmana quan els símptomes són més greus.
Nois i noies de 12 a 15 anys: un descomprimit per cada aplicació fins a un màxim de 6 al mes; especialment dissabtes a la tarda de 4,30 a 7 i un màxim de cap de setmana quan els símptomes són més greus, en funció de la disposició dels afectats.
Joves de 18 a 99 anys: 10 comprimits cada dia abans i després de dormir, cap de setmana inclòs; augmentar la dosi en cas de reunitis.
- Els comprimits es poden pendre al cau o bé a l'aire lliure, tan si plou com si fa sol. Menys en els casos que el metge de capçalera indiki el contrari es pendrà amb el foulard al coll i excepcionalment amb tot l'uniforme.
- Contraindicacions** No subministrar a malalts d'antipatia crònica o aguda. En cas d'escassa disposició al bon humor i a les ganes de treballar, consulteu al vostre animòleg.

Precaucions	L'ingesta de l'Indikina s'ha relacionat amb la síndrome del Mai-paris malaltia molt poc freqüent però que pot afectar a les persones més sensibles. Si es presenten símptomes de fiblades o phlaton s'ha d'interrompre el tractament durant la setmana per tornar-hi el proper dissabte amb dosi doble.
Interaccions	Pot potenciar l'efecte de la bona-acció-diària així com incrementar els nivells d'amistat i companyonia. No administrar amb fàrmacs electrònics (com videoconsoles) o medicaments rics en glucosa (com les xuxes).
Efectes secundaris	No han estat descrits. Pot provocar adicció.
Intoxicació i tractament	La simptomatologia de sobredosificació inclou: fractures diverses, roba estripada, mitjons bruts, tendes foradades, estris perduts, mal de peus i cap, pèrdues de classe els dilluns, refredats i altres efectes lleus no descrits encara. En cas de sobredosi consultar al servei informàtic del fabricant: http://www.indika.cat o al servei telefònic: 666 254 894 (Marta)
Presentació	Envàs de 32 tardes de cau i 10 o més sortides Registat a la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques - Registre d'Associacions de la Generalitat, secció primera de Girona, amb el número 3143. SENSE RECEPTA MÈDICA

Aquest medicament cal mantenir-lo a l'abast de nens i joves.

Disponible a partir del proper dissabte, 22 de gener a la vostra farmàcia de guàrdia (c/ Nou, 11)